

- B. clusiacea* Baill. — Baie de Boulari, Prony.  
*Fontainea Pancheri* Heck. — M<sup>t</sup> Mou.  
*Bocquillonia scssiliflora* Baill. — Dumbéa.  
*Cleidion Vieillardii* Baill. var. *genuinum* Müll.-Arg. — Prony.  
*Macaranga coriacea* Müll.-Arg. — M<sup>t</sup> Koghi.  
*M. Vieillardii* Müll.-Arg. — Prony.  
*Ficus Webbiana* Miq. — Yahoué.  
*Microstylis taurina* Reichb. f. — Prony.  
*Liparis Layardii* F. Muell. — Prony.  
*Dendrobium steatoglossum* Reichb. f. — M<sup>t</sup> Mou.  
*D. verruciferum* Reichb. f. — Prony.  
*Phreatia oubatchensis* Schltr. — M<sup>t</sup> Mou.  
*Spathoglottis Vieillardii* Reichb. f. — Païta.  
*Phajus grandiflorus* Lour. — Dumbéa.  
*Earina Deplanchei* Reichb. f. — Dumbéa.  
*Ceratostylis micrantha* Schltr. — M<sup>t</sup> Mou.  
*Calanthe Balansæ* Finet. — M<sup>t</sup> Mou.  
*Dipodium viridescens* Kränzl. — Prony.  
*Appendicula Vieillardii* Reichb. f. — M<sup>t</sup> Mou.  
*Coitochitus neo-caledonicus* Schltr. — Dumbéa.  
*Thelymitra longifolia* Forst. — Prony.  
*Acianthus nanus* Rendle. — Prony.  
*Liperanthus gigas* Reichb. f. — M<sup>t</sup> Mou.  
*L. glandulosus* Schltr. — Païta, M<sup>t</sup> Mou.  
*L. tatissimus* Schltr. — Dumbéa.  
*Caladenia carnea* R. Br. — Prony.  
*Habenaria ngoyensis* Schltr. — Dumbéa.  
*Campynemanthe viridiflora* Baill. — Yahoué.  
*Eriocaulon neo-caledonicum* Schltr. — Prony.  
*Podocarpus minor* Parlat. — M<sup>t</sup> Mou.

LIX. — PLANTES DE COLLECTEURS DIVERS (*suite*).

*Pitiosporum scythophyllum* Schltr. — M<sup>t</sup> Humboldt (*Balansa* 2.497).

\* **Oxalis Balansæ** Guillaum., sp. nov.

*Frutex ad 30 cm. altus, caule simplice, dense squarroso, lignoso, 2 mm. crasso, densissime basibus petiolorum emarcidis persistentibus, squarroso, apice foliis dense obsito, foliis numerosis, foliis 3, sessilibus, glaucis, usque ad 1/4 obcordatis, basi cuneatis, margine integris, in utraque pagina dense papillois, petiolo 3 cm. longo,*

*primum sparsissime rufo-piloso, mox glaberrimo apice tantum pilis rufis penicillato, rigido. Pedunculi usque ad 9 cm. longi, glabri, bracteis numerosis, linearibus, sparse pilosis, 2 mm. longis, pedicellis 5-7, filiformibus, usque ad 1 cm. longis, glaberrimis, sepalis lanceolatis, glaberrimis, 3 mm. longis, petalis luteis, oblongis, 1 cm. longis, glabris, staminibus majoribus minoribus 2-plo longioribus, 5 mm longis, glaberrimis, stylis glaberrimis.*

M<sup>t</sup> Poume (*Balansa* 3.182).

Rentre évidemment dans le même groupe que les *O. Novæ-Caledoniæ* Knuth et Schlechter (1919) = *O. neo-caledonica* Guillaum. (1920) et *O. Elsæ* Knuth (1) et les espèces néo-calédoniennes se distinguent ainsi :

Plante herbacée, traînante ..... *O. corniculata*.  
Plantes ligneuses, dressées.

Tige ramifiée, feuilles en bouquets à l'extrémité de rameaux courts.

Fleur isolée, pétiole à touffe de poils bruns au sommet

*O. Novæ-Caledoniæ*.

Fleurs plusieurs sur un pédoncule pas plus long que les feuilles, pétiole sans touffe de poils roux au sommet..... *O. Elsæ*.

Tige simple terminée par un bouquet de feuilles, fleurs plusieurs sur un pédoncule bien plus long que les feuilles, pétiole à touffe de poils roux au sommet ..... *O. Balansæ*.

*Boronella crassifolia* Guillaum, — M<sup>t</sup> Pénari (*Balansa* 3.537).

*Comptonella atbiflora* Bak. f. — Nouvelle-Calédonie (*Pancher* 312) M<sup>t</sup> Koghi (*Pancher* 24,300), Ferme modèle (*Balansa* 378), Canala (Viellard 2.272, *Balansa* 1.795<sup>a</sup>), Canala, M<sup>t</sup> Arago (*Balansa* 1.796), baie de Tupiti (*Deplanche* 2.272), Néoué (*Deplanche* 308), Balade (Viellard 300), Gatope (Viellard 2.462, *Deplanche* 309), Poume (*Balansa* 3.370), de Art (*Balansa* 3.370<sup>a</sup>).

*Dutailleya sessitifoliola* Guillaum. — M<sup>t</sup> Koghi (*Pancher* 292), La Conception (*Balansa* 2.794), N. E. de La Conception (*Balansa* 1.017), Sommet du Nékou (*Balansa* 1.017<sup>a</sup>), Wagap (*Viellard* 2.452).

Le fruit n'était pas encore connu dans le genre :

*Fructus sepalis persistentibus coriaceus, indehiscens, 2-4 lobus, lobis parum distinctis, supra 2-4 apiculatus, 8 mm. altus, 2,5 mm. latus, aurantiacus, supra sparse stellato-pilosus, seminibus 2-4, nigris, nitentibus, albumine copioso, embryone in medio erecto.*

(1) Il est à noter que la clef dichotomique de Knuth (*Pflanzenreich*, IV, 130, p. 44) indique pour l'*O. Elsæ* « *pedunculis unifloris* » mais que la description (p. 182) mentionne des pédicelles au nombre de « *circ. 5* ».

*Terminalia Catappa* L. — Nouvelle-Calédonie (*Deplanche* 503), Nouméa (*Balansa* 1.313).

*T. litoralis* Seem. — Nouvelle-Calédonie (*Kay* 48, *Petit* 112, *Pancher* 48, *Germain*, *Beaudouin*, *Vieillard* 557), Nouméa (*Deplanche* 107, *Balansa* 408), Hienghébane (*Deplanche* 350), île des Pins (*Germain*).

*Xanthoslemon aurantiacum* Heck. — Sud de la Nouvelle-Calédonie (*Raoul*), île des Pins (*Jeanneney*).

*Syzygium lateriflorum* Brong. et Gris. — Nouvelle-Calédonie (*Pancher* 39, 46, 55, *Deplanche* 359), M<sup>t</sup> Mou (*Brousmiche*), M<sup>t</sup> Nékou (*de Pompéry*), Bourail (*de Pompéry*).

*Homalium Deplanchei* Warb. — Nouvelle-Calédonie (*Pancher* 36).

*Tabernæmontana orientalis* R. Br. — Balade (*Labillardière*).

*Ipomæa congesta* R. Br. — Bourail (*Pennel* 17).

*Ocimum Basilicum* L. var. *purpurascens* Benth. — Lifou (*Thiébaud* 257, *Deplanche*).